

Garantice el cumplimiento del tratamiento antidepresivo para mantener el beneficio terapéutico.¹


Referencia: 1. Sawada N et al. BMC Psychiatry 2009;9:38.

NP-CL-NS-BNNR-210003 | Julio 2021

Para mayor información consulte a su médico.



Datos sobre la **no adherencia** al tratamiento^{2,3}



La adherencia de los pacientes a los medicamentos antidepresivos es baja
La no adherencia a los medicamentos antidepresivos es una barrera significativa para el tratamiento exitoso de la depresión en la práctica clínica

Consecuencias del no cumplimiento de la terapia antidepresiva^{2,3}



Mayor riesgo de recurrencia



Aumento en la severidad de la depresión



Aumento en la tasa de hospitalizaciones y visitas a Emergencia



Aumento en costos relacionados con la salud

Para mayor información consulte a su médico.

Referencias:

1. Sawada N et al. BMC Psychiatry 2009;9:38. 2. Chong WW et al. Int J Clin Pract 2011;65(9):954-975. 3. Keller MB, et al. Int Clin Psychopharmacol. 2002;17:265-271. 4. Journal of Affective Disorders 2016;193:1-10. 5. Demyttenaere K et al. European Neuropsychopharmacology 2003;13:569-575.

¿Cómo mejorar la adherencia⁵?




▶ Comprenda a fondo su tratamiento de acuerdo a las explicaciones de su médico



▶ Defina fechas para realizar seguimiento con su médico



▶ Configure recordatorios o alarmas para la toma de los medicamentos



Para mayor información consulte a su médico.

Referencias:
1. Sawada N et al. BMC Psychiatry 2009;9:38. 2. Chong WW et al. Int J Clin Pract 2011;65(9):954–975. 3. Keller MB, et al. Int Clin Psychopharmacol. 2002;17:265–271. 4. Journal of Affective Disorders 2016;193:1-10. 5. Demyttenaere K et al. European Neuropsychopharmacology 2003;13:S69–S75.